

Bahnhofstrasse 110
 CH - 8001 Zürich

Telefon: 044 225 41 41
 Telefax: 044 225 41 42
 www.hautzone.ch



Allergiealgorithmen praktisch

Alkoholunverträglichkeit (unspez. Histaminliberation)	Prick des C2, Natriumdisulfit Prick, evtl. OPT Natriumdisulfid. Evtl. ½ h vorher Semprex tbl. Oder zusätzlich Zantic Tbl. Oder Nalcrom Tbl. Bis 800mg/d vor dem Essen/trinken.
Asthma Bronchiale	Symbicort 200 2x/d, Bricanyl oder Ventolin in reserve, Evtl. Singulair (Leukotrieneantagonist) wenn starke entzündliche komponente, Lomudal forte. 4x/D prophylaktisch In SS erlaubt: Lomudal DA und Lomusol Nasenspray, Fenistil Kps.
Bienen und Wespengiftallergie	Spez. IgE für B/W, Hautschwelle B/W, evtl. CAST wenn negativ HS oder keine oder kaum IGEs, Tryptase, Erfolgsquote SIT: Biene ca 85 %, Wespe ca. 90%, Dauer 5 Jahre. KO HS und Spez. IGE nach 3 und nach 5 Jahren.
Kreuzreaktionen Medikamente	Penicilline und Cephalosporine Antiepileptika: Phenytoin, Carbamazepin, Phenobarbital → 45 % Risiko untereinander kreuzreaktionen zu haben wenn auf eines allergisch. Ausweichmedikament: Valproinsäure
Lokalanästhetikaallergie	LA-Reihe, falls i.c. 1: 1 positiv → Natriumdisulfit und Benzoessäure s.c. dann die entspr. LA s.c.
Rezidiv. Infekte obere Luftwege	IGG Subklassen, IGA, IgM, Therapie: evtl.. Broncho-Vaxom Kps.

